

Stop Canibalismo



PROTECTOR ANTISÉPTICO DE HERIDAS QUE EVITA EL CANIBALISMO

Efecto disuasorio

Eficaz en brotes de canibalismo porcino.

Efecto antiséptico

Antiséptico natural de las heridas comunes/típicas debidas a competencia, estrés, reagrupamientos...:
corte de rabos (caudotomía), ombligos, necrosis auricular, identificación (crotal)...

Efecto protección-recuperación en zonas de riesgo

Efecto filmógeno que protege y recupera los tejidos acelerando la cicatrización.



RECOMENDACIONES DE USO

Brote de canibalismo porcino (madres, lechones, transiciones y cebo)

- Pulverizar las zonas de riesgo y/o afectadas del animal con 2 aplicaciones al día.
- Posología: 7 días.
- Procurar que el envase tenga en el momento de aplicación una temperatura en torno a 20°C.
- Pulsar **enérgicamente** para una mejor pulverización y cobertura.

Stop Canibalismo

+ DEFENSA

El intenso sabor amargo por su contenido en **benzoato de denatonium** (bitrex), produce un efecto de **defensa frente a la agresión** sobre orejas y colas, consecuencia del nerviosismo provocado por el estrés.

+ RECUPERACIÓN

Las propiedades cicatrizantes de la **alantoína** favorecen la proliferación celular y la **regeneración de los tejidos dañados**. No contiene alcohol, no produce escozor, y su pH neutro evita irritaciones en la piel.

+ PROTECCIÓN

La resina natural de **Croton lechleri** (látex), genera una película transpirable que **protege las heridas** frente a los patógenos medioambientales y acelera su "secado" favoreciendo la evolución de la cicatrización.

Indicaciones y especies de destino

Antiséptico de heridas que acelera la cicatrización.

Genera una película transpirable que protege las heridas.

Su sabor amargo disuade de los comportamientos caníbales.

Especies de destino: todas.

- En porcino:
 - Madres: caudofagia, necrosis auricular.
 - Lechones: prevención de hernias umbilicales y del canibalismo.
 - Transiciones: evita, recupera y protege las heridas de mordeduras propias del estrés postdestete y de los reagrupamientos.
 - Cebo: heridas por mordeduras en rabos, colas, flancos, cortes superficiales, etc...

Administración y modo de empleo

Aplicación: pulverizar sobre las zonas de piel afectadas 2 veces al día durante un periodo de 1 semana.

Tiempo de espera: no precisa.

No precisa prescripción veterinaria

Reg. Of. Productos Zoosanitarios: 02416-H

Precauciones y condiciones particulares de empleo

Uso exclusivo por vía tópica.

Manténgase alejado del alcance de los niños.

Mantener alejado de bebidas, pienso y alimentos.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar al médico.

Evitar la exposición del producto a temperaturas extremas.

Utilizar preferentemente antes de 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Utilizar sólo durante los 6 meses siguientes a la fecha de apertura del envase.

Consulte a su veterinario.

Presentación

Envases de 500 ml. y 5 L.

